Guide pratique

- √ Bien compléter les données cliniques :
 - ☆ Sur la fiche de prélèvement (y compris l'identifiant EDMUS)
 - Sur la fiche minimale afin de permettre la saisie des données relatives aux patients et prélèvements dans EDMUS
- √ Faire parvenir dans les deux heures au CRB :
 - ★ Les prélèvements
 - **☆** Le consentement
 - 🗖 La fiche de prélèvement
- Bien saisir les données dans EDMUS :
 - **☆** Le consentement
 - ★ Le panneau prélèvement
 - identifier les cas
- ✓ Questionnaire salivaire obligatoire si prélèvement de salive réalisé
 - A envoyer à : questionnaire@ofsep.org



Kit de prélèvement OFSEP

Attention, en cas de prélèvements différés pour un même patient, le délai maximal entre le premier et le dernier prélèvement est de 24h. Bien envoyer les prélèvements au fur et à mesure.

Nous contacter

Besoin d'informations sur la biologie ? Contactez le groupe biologie :

biologie@ofsep.org

Vous avez un projet? Faites votre demande d'échantillons en téléchargeant le formulaire de soumission de projet sur notre site Internet puis envoyez-le à :

soumission-projet@ofsep.org

Centre de Coordination **National OFSEP**

Service de Neurologie A Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer 59 Boulevard Pinel - 69677 BRON Cedex

> Tél: +33 (0)4 72 35 73 42 Fax: +33 (0)4 72 68 13 18

contact@ofsep.org

Retrouvez-nous sur www.ofsep.org























Guide à destination des neurologues

> Version 10.0 applicable le 20/06/2024

Guide pratique

Critères d'inclusion pour les cohortes biologiques OFSEP

Nous contacter







Critères d'inclusion des patients pour les cohortes biologiques OFSEP

Critères généraux

- √ Consentement OFSEP obligatoire
- ✓ Données minimales OFSEP obligatoires et si possible au moins deux ans après le prélèvement
- √ Fiche de prélèvement OFSEP obligatoire
- √ EDSS obligatoire dans une fenêtre de ± 3 mois par rapport à la date de prélèvement
- ✓ IRM au format OFSEP recommandée

Recommandations:

- 🙎 Ne pas prélever les femmes enceintes.
- Afin de garantir la qualité des échantillons biologiques, évitez de prélever à moins de 30 jours d'un traitement par corticoïdes, plasmaphérèse ou lg IV, et à moins de 12 mois d'un traitement de fond.

RIS et Pré-RIS

Syndrome Radiologiquement Isolé

Critères d'inclusion

- ★ Lésions IRM évocatrices de pathologie inflammatoire
- Motif de prescription de l'IRM non concordant avec la présence des lésions
- **⋣** EDSS=0

Critères d'exclusion

↑ Toute manifestation neurologique focale antérieure à la réalisation de l'IRM

Prélèvements **itératifs annuels** (± 6 mois / kit R) jusqu'à conversion.

Pensez à faire valider par le centre coordinateur de Nice avant de taguer dans la base EDMUS

contact : callier.c@chu-nice.fr

SEP PP

Sclérose en plaques progressive d'emblée

- ↑ Diagnostic de SEP selon derniers critères en vigueur
- **⋬** Âge < 65 ans
- ★ Durée d'évolution < 6 ans
 </p>
- Naïf de traitement de fond ou n'ayant pas reçu de traitement de fond depuis au moins 12 mois au prélèvement
- N'ayant pas reçu de corticothérapie à forte dose dans les 30 jours précédant le prélèvement

Prélèvements **itératifs** à **3 ans** (± 1 an) et **6 ans** (± 1 an) avec un kit OFSEP Bio complet.

CIS / SEP RR

Syndrome Cliniquement Isolé / Sclérose en plaques Rémittente-Récurrente

- Patient présentant un premier événement inflam--matoire du système nerveux central datant de moins de 6 mois au moment du prélèvement, remplissant ou non les derniers critères de SEP en vigueur (McDo+ ou McDo-)
- Suivi régulier (visite annuelle) dans un centre remplissant les missions de CRC SEP
- IRM OFSEP concomitante à ± 2 mois du prélèvement initial (recommandée pour les prélèvements itératifs)
- Naïf de traitements de fond au prélèvement initial
- Absence de corticothérapie à forte dose dans le mois précédant, pour tous les prélèvements

Prélèvements itératifs à 1 an (± 6 mois / kit R), 3 ans (± 6 mois / kit R) et 5 ans (± 6 mois / kit OFSEP Bio complet); prélèvement itératif supplémentaire en cours de poussée depuis moins de 30 jours (kit R, limite de un prélèvement de ce type jusqu'au prélèvement à 5 ans).

NOMADMUS

- ☐ Critères internationaux de la NOMAD (critères de Wingerchuk 1999, 2006 et 2015)
- 🐧 Ou syndrome neurologique apparenté :
 - Myélite aiguë transverse longitudinale extensive
 - NORB isolée atypique
- Ou patients ayant des anticorps anti-AQP4 ou anti-MOG, y compris ADEM

Prélèvements itératifs (avec un kit OFSEP Bio complet) pour les patients dont le prélèvement initial est après la première poussée (et avant une éventuelle seconde poussée, quel que soit le délai entre la première poussée et le prélèvement) à 1 an (± 6 mois), 3 ans (± 6 mois) et 5 ans (± 6 mois); prélèvement itératif supplémentaire en cours de poussée depuis moins de 30 jours (limite de un prélèvement de ce type jusqu'au prélèvement à 5 ans).

Pensez à faire valider par le groupe NOMADMUS

contact : nomadmus@ofsep.org

ADEM

EncéphaloMyélite Aigüe Disséminée

- ↑ Patients négatifs pour l'auto-anticorps anti-AQP4 et l'auto-anticorps anti-MOG ou sérologies non réalisées
- 🕱 Prélèvement au moment du diagnostic d'ADEM

LEMP

Leuco-Encéphalopathie Multifocale Progressive

- ★ Sous traitement pour une SEP
- ▲ LEMP avec diagnostic confirmé par PCR
- ☆ Prélèvement dans un délai de 1 mois suivant le diagnostic de LEMP ou d'IRIS